

## Hướng Dẫn Cách Trồng Cây CFPM 30

Làm đất	Cày bừa 21 n. Xới thu hoạch để dể "Roundup" chôn kho 5 ngày. Nếu đất còn m c thì bừa tấp lúp c để xử lý cỏ dại. Chôn bừa gieo hạt.
Gieo trồng	Sau 24 giờ hoặc 48 giờ bừa gieo hạt. Khi nhiệt độ trên 120C. Nếu trời c khi gieo có mưa lớn thì phải chờ đất khô mới gieo.
Khoảng cách gieo trồng	Gieo hàng cách hàng 15 cm. Cây cách cây 5-8 cm.
Mật độ	Gieo 2-3 hạt/l . 15 kg/ha (850,000 cây/ha).
Sâu gieo hạt	Gieo sâu khoảng 2-3 cm. Nếu đất pha thì gieo sâu hơn 4-5 cm.
Máy gieo hạt	Máy gieo hạt có rãnh luống và h phủ hạt. Máy rãnh 80% hạt rơi xuống đất.
Prussic Acid	Không có Prussic Acid.
Thức gia súc	Dùng chua, bổ m nh cho n t i và c khô.
Chế độ phân bón	Sử dụng 1 kg phân bón b n g 70% l ng phân bón cho cây ngô. Khuy n cáo sử dụng trung bình v i các lo i t: 150 kg N + 100 kg P + 100 kg K cho 1 ha. Nếu mùa thu hoạch h t c n bón thêm ph n Kali: 121 kg/ha. i v i t i núi có đ c, khô c ng, bón thêm phân m (N): 80 kg/ha. i v i t có m thi u ( t khô c n) bón phân m (N): 100 kg/ha. Nếu quá khô càn, bón thêm phân Lân (P): 66 kg/ha. Nếu t b phèn chua pH<5: bón thêm vôi 1000 kg/ha.  CÁCH CHẾ M SÓC: Bón lót: 50% l ng phân bón nêu trên. Khi cây gieo c 25 ngày, làm c để và bón thúc 50% l ng còn l i. Sau t c t l, bón thêm 30 kg m (N). Các t c t i p theo u bón thêm 30 kg phân m (N).
pH đất	pH t i u c a t là 5.5-8.5.
Thu hoạch	Sử dụng thuốc diệt cỏ "Roundup" hoặc b a t có c d i t r c khi gieo (L ng c d i quá nhi u thì h t khó n y m m).
Chăm sóc khi cây 4-6 lá	Các chất diệt cỏ sau c ng ký sử dụng: PEAK 75WG c ng BANVEL-280; BASAGRAN Forte; 2,4-D Amine hoặc Pardner.
Thu hoạch	Có thể cắt 30 n 35 ngày tr ng. Chiều cao t i u chi u cao 90-100cm. L ch c t l n 2 và l n 3 là 10 n 20 ngày sau hoặc c cao 90-100cm.
Chiều cao thu hoạch	g c khoảng 10-15 cm so v i m t t cho cây tái sinh nhanh h n.
M khi thu hoạch	Thu hoạch làm chua m 65%. Thu hoạch b n g máy óng bánh tròn ph i trên ng ru ng m 40% và c óng gói trong bao PVC. m là 18-20% n u óng bánh bale.
Năng suất và chất lượng cây thức ăn	Năng suất v t ch t khô t 10-14 t n/ha (t t c các l n c t). Chiều cao (%dm) 14-16% CP, 28-32% ADF, 56-59% NDF và 66-70% TDN và 1.3- 1.4 NEL (Mcal/ kg) bên Canada.

ONE SOLUTION AHEAD!



## Hướng Dẫn Cách Trồng Cây CFPM 101

ONE SOLUTION AHEAD!

Làm đất	Cày bừa 2 lần. Xử lý cỏ dại bằng thuốc diệt cỏ "Roundup" trước khoảng 5 ngày. Nếu đất còn mặn thì bón phân lót trước khi gieo hạt. Chú ý gieo hạt.
Gieo trồng	Sau 24 giờ hoặc 48 giờ bắt đầu gieo hạt. Khi nhiệt độ trên 12°C. Nếu trời mưa khi gieo có mưa lớn thì phải chờ cho đất khô mới gieo.
Khoảng cách gieo trồng	Hàng cách hàng 15 cm, cây cách cây 10-15 cm.
Mật độ	Gieo 2-3 hạt/l. 10 kg/ha (850,000 cây/ha).
Sâu gieo hạt	Gieo sâu khoảng 2 cm. Nếu đất cát pha thì gieo sâu hơn 3-4 cm.
Máy gieo hạt	Máy gieo hạt có rãnh luống và hàng hạt. Mỏng 80% hạt rơi xuống đất.
Prussic Acid	Không có Prussic Acid.
Thức gia súc	Dùng chua, bổ mìn cho nòng và cừu.
Chế độ phân bón	Sử dụng lượng phân bón bằng 70% lượng phân bón cho cây ngô. Khuyến cáo sử dụng trung bình với các loại: 150 kg N + 100 kg P + 100 kg K cho 1 ha. Nếu mùa thu hoạch thì bón thêm phân Kali: 121 kg/ha. Nếu đất chua thì bón thêm phân lân (N): 80 kg/ha. Nếu đất có muối (đất khô cằn) bón thêm phân lân (N): 100 kg/ha. Nếu đất quá khô cằn, bón thêm phân lân (P): 66 kg/ha. Nếu đất chua pH < 5: bón thêm vôi 1000 kg/ha.  CÁCH CHẾ M SÓC: Bón lót: 50% lượng phân bón nêu trên. Khi cây gieo được 25 ngày, làm cỏ dại và bón thúc 50% lượng còn lại. Sau thu hoạch 1, bón thêm 30 kg phân (N). Các thu hoạch tiếp theo bón thêm 30 kg phân (N).
pH đất	pH tối ưu đất là 4.5–7.5.
Thuốc diệt cỏ	Sử dụng thuốc diệt cỏ "Glyphosate" hoặc bất kỳ loại nào khác khi gieo (Lưu ý: dùng đúng liều lượng theo hướng dẫn).
Chăm sóc khi cây ăn dặm 4-6 lá	Các thuốc diệt cỏ sau gieo cấy sử dụng: PEAK 75WG hoặc BANVEL-280; BASAGRAN Forte; 2,4-D Amine hoặc Pardner.
Thu hoạch	Có thể thu hoạch 30–35 ngày trồng. Chiều cao cây thu hoạch 90-100 cm. Chiều cao thân 2 và thân 3 là 10–20 ngày sau hoặc chiều cao 90-100 cm.
Chiều cao thu hoạch	Chiều cao khoảng 10-15 cm so với mặt đất cho cây tái sinh nhanh hơn.
Mật độ khi thu hoạch	Thu hoạch làm chua bằng 65%. Thu hoạch bằng máy ép bánh tròn phía trên nghiền bằng 40% và ép gói trong bao PVC. Mật độ là 18-20% sử dụng ép bánh bale.
Năng suất và chất lượng cây thức ăn	Năng suất tươi khô 10-14 tấn/ha (tính các loại cỏ). Chiều cao thân (dm) 14-16% CP, 28-32% ADF, 56-59% NDF và 66-70% TDN và 1.3- 1.4 NEL (Mcal/kg) bên Canada.



## H ướng Dẫn Cách Tr ồng C ỏ CSSH45

Làm t	Cày b a 2 l n. Xt thu c di t c d i "Roundup" ch kho ng 5 ngày. N u c d i còn m c thì b a ti p l t úp c d i xu ng ho c l y ra kh i ng. Chu n b gieo h t.
Gieo tr ồng	Sau 24 gi ho c 48 gi b t u gieo h t. Khi nhi t t trên 12°C. N u tr c khi gieo có m a l n thì ph i ch cho t khô m i gieo.
Kho ng cách gieo tr ồng	Hàng cách hàng 40 cm, cây cách cây 5 cm.
M t h t	Gieo 2-3 h t/l . 15 kg/ha (850,000 cây/ha).
sâu gieo h t	Gieo sâu kho ng 2-3 cm. N u t cát pha thì gieo sâu h n t 4-5 cm.
Máy gieo h t	Máy gieo h t có r ch lu ng và h p ng h t.
Prussic Acid	Không có Prussic Acid.
Th c n gia súc	Dùng chua ho c b m nh cho n t i.
Ch phân bón	S d ng l ng phân bón b ng 70% l ng phân bón cho cây ngô. Khuy n cáo s d ng trung bình v i các lo i t: 150 kg N + 100 kg P + 100 kg K cho 1 ha. N u mu n thu ho ch h t c n bón thêm ph n Kali: 121 kg/ha. i v i t i núi có d c, khô c ng, bón thêm phân m (N): 80 kg/ha. i v i t có m thi u ( t khô c n) bón phân m (N): 100 kg/ha. N u t quá khô càn, bón thêm phân Lân (P): 66 kg/ha. N u t b phèn chua pH<5: bón thêm vôi 1000 kg/ha.  CÁCH CH M SÓC: Bón lót: 50% l ng phân bón nêu trên. Khi cây gieo c 25 ngày, làm c d i và bón thúc 50% l ng còn l i. Sau t c t 1, bón thêm 30 kg m (N). Các t c t ti p theo u bón thêm 30 kg phân m (N).
pH c a t	pH t i u c a t là 5.5–8.5.
Thu c di t c	S d ng thu c di t c "Glyphosate" ho c b a t có c d i tr c khi gieo (L ng c d i quá nhi u thì h t khó n y m m).
Ch m sóc khi cây ã n y m m c 4-6 lá	Các ch t di t c sau c ng ký s d ng: PEAK 75WG c ng BANVEL-280; BASAGRAN Forte; 2,4-D Amine ho c Pardner.
Thu c t	Có th c t t 70 n 85 ngày tr ng. Ch t l ng c t i u giai o n khi h t chuy n sang giai o n màu xanh.
Chi u cao thu c t	Thu c t giai o n h t màu xanh.
m khi thu c t	Thu ho ch làm chua m 65%. Thu ho ch b ng máy óng bánh tròn ph i trên ng ru ng m 40% và c óng gói trong bao PVC. m là 18-20% n u óng bánh bale.
N ng su t và ch t l ng cây th c n	N ng su t v t ch t khô t 14-18 t n/ ha. Ch t l ng th c n (%dm) 10-12% CP, 26-30% ADF, 47-56% NDF và 66-70% TDN và 1.3- 1.5 NEL (Mcal/ kg) bên Canada.

